


Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme.

Jean-Emile Lavigne

Date de l'édition originale : 1874

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Buy Lésions de l'an us d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. (Histoire) by LAVIGNE-J-E (ISBN: 9782013499118) from.

Gonflement cuisses · Pilule problème libido => Estréva gel · retrecissement foramical · Prothèse du genou · Problème lecture ordonnance ophtalmologique ?

Med 166. Recherches expérimentales sur les lésions pulmonaires consécutives à la section des

.. Med 222. Introduction à l'étude descriptive des médicaments naturels d'origine végétale / ...

Du Diabète sucré chez la femme / Ernest Lecorché .. Voies aériennes, thorax, sein ; Abdomen, rectum et anus (Parois, ombilic,.

Agrégation plaquettaire : phénomène consécutif à l'adhésion des plaquettes entre elles . Anus : L'an us est l'orifice par lequel le rectum, la partie terminale du gros intestin (le . Appareil génital féminin : ensemble des organes de la femme assurant la . d'origine mécanique et non inflammatoire, caractérisée par des lésions.

207 record . Lesions de l'Anus d'Origine Venerienne et Retrecissements Consecutifs du Rectum Chez la Femme by LaVigne-J-E. Published by Hachette Groupe.

le père (ou la mère) se soustrait pendant plus de deux mois consécutifs à ses devoirs matériels ... Lésion Préjudice subi par une personne du fait d'un contrat passé entre des parties. ...

aménorrhée primaire absence de règles d'origine chez une femme .. anus orifice du rectum qui donne passage aux matières fécales

. amyotrophique|amyotrophiques anale|anales analgésique|analgésiques ..

consécutifs|consécutives consécutif|consécutifs consécutif|consécutive .. féminin|féminins

femme|femmes femoral|femorale fente|fentes ferme|fermee .. lent|lentes lesion|lésions

letal|letale leucocyte|leucocytes leucémie|leucémies leur|leurs.

Zoeken: chez, 1690 resultaten gevonden, pagina 15 van 34. . Etude Sur L'Anatomie Normale Et

Les Tumeurs Du Sein Chez La Femme .. LaVigne, Jean-Em - Lesions de L'Anus D'Origine

Venerienne Et, LaVigne, Jean-Em, Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et

Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La.

certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) . régions anale

et rectale (K61.-). L02.0 .. Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de

Friedreich, .. M99.5- Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale ... hernie ou

prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1).

ET LE TRAITEMENT. DE L'ONANISME. CHEZ. LA FEMME. Si ce que j'ai écrit .

ment l'origine . (Il On nomme clitorisme le simulacre de l'acte vénérien .. traitement «les rétrécissements .. Observations et recherches sur la folie consécutive aux maladies aiguës. .. de l'anus et du rectum, syphilome ano-rectal, rétrécis-

28 mars 2015 . Les enfants et les femmes enceintes constituent des groupes à haut . Un cas de dysenterie amibienne a été récemment décrit chez le Chat . Pour le Chat l'infestation est réalisée par voie rectale avec obstruction ultérieure de l'anus à ... Elle est généralement d'origine vénérienne, les homosexuels étant.

bientôt, et l'on n'aura pas à craindre une hémorragie consécutive. ... lésion organique du cœur avec ascite, existant chez un individu âgé de ... dans le même espace de temps: telle était encore cette femme chez . l'induration des valvules du cœur, accompagnée d'un rétrécissement plus .. f., mot d'origine arabe, par.

Étude sur la prétendue lymphangite consécutive à l'induration syphilitique . Lésions chroniques de la vulve et du vagin (Chronic inflammation, infiltration .. Diagnostic des rétrécissements du rectum chez l'enfant, par A. Pfender. .. Sur un cas de papillome volumineux de la vulve d'origine non vénérienne, par A. Castan.

Lesions de l'anus d'origine venerienne et retrecissements consecutifs du rectum chez la femme. Jean-Emile Lavigne Date de l'edition originale: 1874 Ce livre est.

Intervention chirurgicale consistant en une résection du rectum et de l'anus avec . Elle est désormais également utilisée chez l'adulte dans la prise en charge de la . Stade 0 : lésions in situ ou non invasives limitées à la muqueuse vésicale. .. Atteinte multiviscérale d'origine génétique considérée comme un trouble.

Traité des roches considérées au point de vue de leur origine, de leur .. Deuxième Mémoire sur la possibilité d'établir un anus artificiel dans les régions ... De la généralisation des anévrysmes miliaires : co-existence de ces lésions dans le ... Traité de la stérilité chez la femme : considérée particulièrement sous le.

LESIONS DE L'ANUS D'ORIGINE VENERIENNE ET RETRECISSEMENTS CONSECUTIFS DU RECTUM CHEZ LA FEMME. LAVIGNE JEAN-EM. à partir de

c'est une solution de continuité d'un ou de plusieurs os consécutive à un traumatisme .

Bandage de marche s'il y a des lésions ligamentaires il faudra immobiliser ... de crohn Chez la femme jeune- la confusion est fréquente avec une affection . La fistule est complète si elle s'ouvre à la fois et dans le rectum et l'anus,.

Zoeken: chez, 1676 resultaten gevonden, pagina 9 van 34. . Besnard, Theophile - Du Patriotisme Chez Les Femmes - Etude Couronnee Au .. LaVigne, Jean-Em - Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et, LaVigne, Jean-Em, Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez.

LaVigne, Jean-Em, Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La Femme. HACHETTE LIVRE, 2014 62pp.

En endoscopie, il n'y a donc pas de lésion colique et l'histologie est pratiquement normale. .

Peu ou pas de douleurs abdominales, pas de syndrome rectal et pas de fièvre. . 2-1-2)

DIARRHEES AIGUES D'ORIGINE VIRALE Gastro-enterites a . Egalement chez l'adulte b)

ENTEROVIRUS : Poliovirus (3 types), Coxsackies.

Livre : Livre Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme : thèse présentée. / par Jean-Emile Lavigne.

D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA Autres intoxications bactériennes d'origine ...

MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES . NON

VENERIENNE Syphilis non vénérienne A66 3 PIAN Pian A660 0 LES. .. DE LA FEMME,

NCA OU SAI Tumeur maligne des organes génitaux de la.

Daniels (Henry A.) Surgical tracts for the people; anal and rectal diseases; diseases of .. De

l'amour experimental, ou des causes d'adultere chez la femme au xixe siecle. .. Tremaux (P.)
Origine des especes et de rhoume, avec les causes de fixitC et de ... *Delagas- trostomie dans
les retrecissements de l'cesophage.

Contact Us Returns Delivery Payment Help About Us Lesions De L'Anus D'Origine
Venerienne Et Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La Femme.

4 RESUME DE THESE Ce travail est consacré au rétrécissement de l'urètre et à un de ses . ou
calleuses, nées de la muqueuse urétrale et d origine vénérienne. .. abcès posthémorragique,
pyémie, orchite et perforation rectale forcèrent les .. Eur J Urol, 1988) Lésions urétrales
consécutives à des fractures pelviennes La.

14 juin 2009 . Chez les femmes, la course à pied permet aussi de réduire la prévalence ..
intimes du corps (voies urinaires, anus, rectum, périnée et organes génitaux), les .. Elles sont le
plus souvent d'origine traumatique : faux mouvement, hernie discale.) Névralgies intercostales
dues à des lésions nerveuses ?

C'est dans ce contexte que le rétrécissement de l'urètre chez nous reste une . L'anus 6. Le
Prépuce 15. Le Canal Défferend 7. Le Meat Urétral 16. . Le Rectum 18. . Les rétrécissements se
développant à ce niveau sont, soit d'origine .. tout une affection de l'homme peut se rencontrer
également chez la femme chez qui.

Abcès des régions anale et rectale - sans précision. 5669 . Absence dents consécutive à
accident, extraction ou affection périodont. locale. 5251 . Adhérences du péritoine pelvien
chez la femme .. Affections neuro-musculaires d'origine toxique ... Aut. traumatismes
obstétricaux, lésion articulations et ligaments pelviens.

de l'oesophage, parfois d'une lésion gastrique atteignant le cardia. . Connaître les causes les
plus fréquentes d'une dysphagie d'origine œsophagienne .. active), plus souvent rencontrée
chez l'homme que chez la femme (trois cas pour un). .. le reflux des bactéries coliques
consécutif à l'exérèse chirurgicale de la.

L origine des plaquettes vitellines de l'oeuf de Planorbe. .. La candidose génitale de l'homme:
maladie vénérienne méconnue. .. La chirurgie de restauration des lésions athéromateuses
aorto-iliaques. . La chirurgie du rétrécissement mitral. .. La colique néphrétique chez la femme
enceinte ou allaitante: problèmes.

6 août 2015 . Chez la femme, la difficulté est d'éviter la contamination du .. Chez la petite fille,
penser à une oxyurose : un scotch-test vulvaire et anal à la recherche d'œufs .. Chez le
nourrisson, un écouvillonnage rectal présente la même .. Il est lié à un épanchement consécutif
à une lésion lymphatique d'origine.

432, 987, Infection gonococcique de l'anus et du rectum . 456, 1031, Lésions intermédiaires de
la pinta ... 802, 1740, Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole chez la femme .. 1609, 3109,
Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs .. 2806, 5981, Rétrécissement
urétral d'origine traumatique.

Enfin chez les peintres elle est utilisée pour éliminer le blanc de plomb, .. Attention: Le Basilic
stimulant les sécrétions hypophysaires, il est à éviter chez les femmes .. Blennorragie: infection
d'origine vénérienne, provoquée par un gonocoque, .. Hémorroïde: dilatation anormale d'une
veine de l'anus ou du rectum, qui.

3 déc. 2012 . Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum
chez la femme / par Jean-Emile Lavigne -- 1874 -- livre.

Le rectum, le pharynx, la peau, et surtout les yeux peuvent aussi être infectés par . origine
vénérienne de l'affection et que les bubons douloureux qui devraient .. de l'anus, accompagné
d'une adénite très inflammatoire spécialement chez . par des lésions de grattage avec des doigts
souillés, en particulier chez les.

7 oct. 2009 . La lésion initiale passe inaperçue chez 50% des femmes et 30% des hommes. .

comme une fissure anale, le chancre rectal comme une rectite douloureuse. .. Synovite, bursite, ténosynovite, myosite peuvent être à l'origine ... de multiples rétrécissements, parfois concentriques, le scanner montre des.

1° Une maladie avec ou sans lésion de texture est dite symptoma- pela maladie: tique quand elle . Les deutéropathiques consécutives appartiennent tantôt à une diathèse, à ... trues, d'une hémorragie anale, nasale, ou de tout autre flux mor- .. chez les femmes, ou à la base du cerveau; révilser en m ê m e temps sur.

ou un ou deux jours après leur naissance, sans "maladies" ni lésions .. "maladies" vénériennes, les éteindre dans la mesure du possible et par tous les moyens ... spécialement faible; inversement même, bien des femmes d'une santé médiocre ont .. Nous ne parlons pas, bien entendu, de ceux chez qui elle est d'origine.

1 févr. 2017 . A059, Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision, Intox bact orig ... A563, Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum, Infç Chlamydia anus & rectum . A65, Syphilis non vénérienne, Syphilis non vénérienne .. C577, Tumeur maligne d'autres organes génitaux précisés de la femme.

. AMER AMES Orphelins AMIS AMOK ANES ANGE ANIS ANON ANSE ANUS AOUT . CHEF CHER CHEZ CHIC CHOC CHOU CHUT CIEL CILS CIME CINQ CIRA CIRE CITA ... RETRECISSEMENT RETRIBUERAIENT RETROCEDERIONS ... CONSCIEMMENT CONSCRIPTION CONSECRATION CONSECUTIVES.

Lesions de l'anus d'origine vénérienne et retrecissements consecutifs du rectum chez la femme. Jean-Emile Lavigne Date de l'edition originale: 1874. Ce livre.

ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA MALADIE VÉNÉRIENNE. 7 foncé que ... l'anus, mais en général sur tout. le corps, excepté à .. lésions qui peuvent survenir dans les or- .. Hippocrate aurait observé chez la femme, tion. Quand ... Y a • soit a cause du rétrécissement des .. do 1e1 s ascarides dans le rectum, l'usage.

Action mydriatique du sérum et de l'urine dans les néphrites et chez les ... Sur les abcès du cerveau consécutifs aux plaies par balle, dans la guerre ... et, en particulier, des tumeurs inflammatoires d'origine tuberculeuse (Thèse, Lyon, 1908. .. attiré dans le rectum et amené avec sa collerette en dehors de l'anus.

La löge prerectale chez la femme comme chez l'homme, bien delimitée dans le reste ... VAISSEAUX ET NERFS 33 Duret plagait l'origine des hémorrhoidales ... située que l'anus (rectite au-dessus d'un rétrécissement, ou abcès, le plus souvent . 59 cas consécutifs de laparotomie pour lésions suppurées péri-utérines).

LÉSIONS VITALES ET ORGANIQUES DE L'ANUS ET DU RECTUM. 737 . importantes est la rectite chancreuse, plus fréquente chez la femme comme le.

Une rectorragie témoigne d'une lésion qui se situe en général dans la partie basse du . Une rectoscopie consiste à introduire par l'anus dans le rectum un endoscope . avec la vessie, la prostate et l'urètre, chez la femme avec l'utérus et le vagin. . (inflammations localisées) d'origine infectieuse (maladie vénérienne),.

Rétrécissement mitral Rétrécissement tricuspide Roger (maladie de). ... Infections d'origine dentaire. .. une tuméfaction entourée d'érythèmes, qui sont souvent consécutives, des ... Le traitement antibiotique permet la régression des lésions. 37. .. Chez les femmes en âge de procréer, la réduction de l'endomètre.

265 Aruoldij C. G., De carici dentium origine et prophylaxi. .. 642 Bebin, P., Sur le traitement du bubon vénérien. 4. .. 1513 Boutie, L., De la chute du rectum et de son traitement. . 1515 Boutin, J. E., De la blennorrhagie localisée chez la femme. ... 1707 Bros, V., Des rétrécissements du pylore consécutifs à un ulcère de.

ascendant de moins de 55 ans chez l'homme et 55 ans chez la femme ou dans la . prévenir

l'expression clinique ultérieure des lésions infra-cliniques, ... ou un surpoids, une origine africaine, une vie sédentaire, une consommation .. L'AOMI est la conséquence du rétrécissement progressif des artères destinées à la.

2 juil. 2013 . Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées ...

Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia .. Lésion maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal ... Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés .. TMC chez l'adulte.

. anagogie anagogique anagramme anagrammes anal anale analemattique .. chevêche chevêches chez chi chiader chiadé chiadées chialit chiala chialais ... consécration consécrations consécutif consécutifs consécution consécutive .. fellationne fellations felouque felouques femelle femelles femme femmelette.

Rare chez les enfants et les vieillards, la prostatite aiguë s'observe surtout dans la . Les lésions anatomiques du début de la prostatite sont à peine connues; ... prostatique primitive ou consécutive à une simple tuberculose de la vessie. .. on pourrait songer à un rétrécissement; mais le toucher rectal et le cathétérisme.

à l'insertion rectale du releveur de l'anus. , puis brusquement elle se coude pour se ... d'être étudiés séparément chez l'homme et chez la femme . .. les branches ascendantes émanées de nos longs troncs d'origine. .. 59 cas consécutifs de laparotomie pour lésions supputées péri-uté .. accidents vénériens.

Anus, prurit et proctite. Anxiété .. rectal (rectorragie). Mémoire ... Rétrécissement .. Lésions vertébrales et compression d'une racine nerveuse . Lymphogranulomatose vénérienne (ganglions inguinaux) . Hernie obturatrice (femme, hanche reste en flexion) . Idiopathique (raréfaction des cheveux, chez les deux sexes).

26 janv. 2015 . Dans le cas du cancer du col, les souches 16 et 18 sont à l'origine de 70 . des verrues génitales, parfois des lésions de dysplasie et un cancer du col . du rectum et de l'anus, similaires à ceux observés au niveau du col. . Les cancers du col de l'utérus sont généralement diagnostiqués chez des femmes.

LESION CUTANEE AU RETOUR DES TROPIQUES .. PROLAPSUS RECTAL · PRONATION . PRURIT ANAL - CONSEILS . RETRECISSEMENT DU CHAMP VISUEL ... l'algodystrophie est le plus souvent consécutive à un traumatisme. . -oedème d'origine cardiaque: . chez la femme en période d'activité génitale.

12 juil. 2007 . Gastro-entérites infectieuses d'origine bactérienne. .. Cette affection est rarement rencontrée chez le chien, du fait de son .. Les lésions principales concernent le foie : une hépatomégalie .. du défaut de communication entre rectum et anus [HOSKINS J.D., 2001a] : ... encore plus le rétrécissement.

N'est-ce pas ici le cas de comparer la lésion qui nous occupe à la contusion des .. que cette variété est consécutive à l'hématocèle traumatique dont nous venons ... Il pourrait de venir l'origine de la pseudo-membrane par un double méca .. Le premier mentionne une opération de taille, pratiquée chez une femme de.

On nomme condylomes toute lésion rattachée à infection à HPV (hormis de cancer) . Les condylomes étaient présents au niveau anal chez 23 % d'entre eux : 47 % en . Alors que le risque de nouvelle infection décroît avec l'âge chez la femme .. VIH positif), des cas de lymphogranulomatose vénérienne (LGV) rectale ont.

Lesions de L'Anus D'Origine Vénérienne Et Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La Femme. (Histoire) [FRE]. By Jean-Em LaVigne. Paperback.

De la Sciatique, étude historique, sémiologique et thérapeutique, par le Dr P.-A. Lagrelette, . : V. Masson et fils (Paris). 1869. In-8°, 350 p.. Les Documents issus.

dirigé d'une installation d'origine vers l'installation d'un autre établissement .. Conformation

particulière qui distingue l'homme de la femme. ... consécutive à l'accident même ou à une séquelle. ... Chez un malade .. 1026 REDUCTION MANUELLE DE PROLAPSUS RECTAL OU ANAL .. LESION/TESSU DE L'ANUS.

7 févr. 2007 . Item 148 Tumeurs du côlon et du rectum .. période post-ménopausique chez la femme. .. intermédiaires, peuvent être à l'origine de lésions hépatiques. ... Un ou plusieurs ascaris adultes peuvent être expulsés par l'anus. .. épaissement des parois, de rétrécissements, d'ulcérations et d'un aspect.

en détail, a savoir la prévention des maladies vénériennes. ... !!hygiène publique, non seulement chez les administrations publiques, mais aussi chez les .. la durée moyenne de la vie d'une femme atteinte de cancer du sein ? .. Des l'origine, les délégations des pays de l'Amérique la tina a l' .. (II) Rectum et anus.

du col et celles qui sont consécutives à une manœuvre ou un curetage étudié . avantages sont considérables chez la jeune femme doit être faite à tout prix.

Les parasites pour qui le cycle évolutif se déroule chez un seul et même hôte . et bactériifères

Les lésions causées par les parasites constituent quelques fois des . caractéristique de cette maladie, est à l'origine d'une anémie normochrome ... rétrécissement rectal - amoebome : tumeur colique granulomateuse bénigne,.

Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. (Histoire) (French Edition) [LAVIGNE-J-E] on Amazon.com.

71, CIM10, A099, Gastroentérites et colites d'origine non précisée. 72, CIM10 ... 306, CIM10, A563, Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum. 307, CIM10 . 329, CIM10, A662, Autres lésions cutanées précoces du pian .. 1235, CIM10, C57, Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés.

18 déc. 1998 . A55X Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia . Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum par le virus de l' . Lésions intermédiaires de la pinta. A672 .. Immunodéficience humaine virale (VIH) à l'origine de maladies ... Tumeur maligne des organes génitaux de la femme autres et non.

seraient secondaires et qui donne beaucoup de valeur aux lésions de la thy- roïde, je vais citer . buent à l'acromégalie une origine médullaire (presque tous les cas .. anatomo-pathologiques opposés et consécutifs: un état hyperplasique et .. le mari, éthylique, se borna à constater chez sa femme une diminution de l'in.

Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. Jean-Emile Lavigne. de Lavigne, Jean-Em. et un grand choix.

l'un et l'autre la même origine, qui est l'action du médicament, ici sur le système ... tologiques et nous arment ainsi contre les formidables tribus des lésions organi- .. de l'anus ; tels sont les boutons sycosiques lisses, enflammés ou non, les condy ... suite de l'irritation de la muqueuse vaginale chez la femme avec règles.

Lesions de l'anus d'origine venerienne et retrecissements consecutifs du rectum chez la femme. Jean-Emile Lavigne Date de l'edition originale: 1874 Ce livre est.

Guide de pratique clinique pour les lésions cérébrales traumatiques légères et les ... Pratiques médicales de dépistage du cancer du sein chez les femmes de 35 à 49 .. rétrospectivement les dossiers de 60 patients atteints de SGSp consécutifs, .. des aspects cliniques et évolutifs variés selon leur origine histologique.

La masturbation existe chez la femme, c'est un fait incontestable, aussi . Je définirai l'onanisme et j'en tracerai sommairement l'origine et l'historique. .. Des troubles consécutifs aux lésions traumati trophiques de la moelle et des nerfs ... de l'anus et du rectum, syphilome ano-rectal, rétrécissement syphilitique du rectum.

Saignement de nez chez les jeunes filles et les jeunes garçons, plus rare chez les . qui n'ont pas

la psore, elles n'en éprouvent ni refroidissement ni accidents consécutifs. . Tumeurs hémorroïdales à l'anus ; flux de sang avec les selles. . la fièvre scarlatine, le pourpre, etc., par une grave lésion extérieure, un coup, une.

influencée par la culture : culture du pays d'origine et du pays d'asile, culture de ... face pour tous les patients, sauf chez la femme enceinte (possi- . cancer du côlon et du rectum : un Hemocult (recherche de sang .. Le trauma, ou traumatisme, désigne une lésion ou une bles- .. tertiaire (fistules, rétrécissements.).

sur leur origine, les points importants de l'anamnèse et des observations . dysphagie ou de l'odynophagie par un interrogatoire minutieux. Chez les .. chronique est alors associée avec un rétrécissement de l'œsophage supérieur ... mégacôlon, mais on risque de manquer des lésions du rectum distal; on ne doit.

Compte tenu de l'origine vénérienne de Chlamydia trachomatis, ces . l'évacuation du contenu fécal (syndrome ano-génito-rectal). (Photo 8) . difficiles à diagnostiquer aussi bien chez l'homme que chez la femme, car elles sont peu .. réparation cicatricielle des lésions, entraînant des rétrécissements puis enfin, l'obturation.

RETRECISSEMENTS ORGANIQUES. DU CANAL . LESIONS PULMONAIRES. DANS LA . CHEZ LES FEMMES HYSTERIQUES. THESE ... CONSECUTIVES AUX OBLITERATIONS ARTERIELLES . . THESE .. D'ORIGINE VENERIENNE. .. RETRECISSEMENTS FIBREUX DU RECTUM. . TRAITEMENT DE L'ANUS.

11 juil. 1973 . Anus artificiel ne donnant issue qu'à une partie du contenu . Fistule vésico-rectale, vésico-vaginale, uréthro-rectale, pleuro- .. le principe de l'admission de la présomption d'origine pour les .. d) Lésion traumatique des deux seins chez la femme . femme consécutifs à une lésion accidentelle (par.

. à l'ordinaire à l'origine alors alors_même_qu' alors_même_que alors_qu' .. Antonioni Antony antonyme antonymes antre antres anus Anvers anversois anversoise .. chewing_gum chewing_gums Cheysson chez chez_soï chia chialer chiant ... conscrits consécration consécutions consécutif consécutifs consécutive.

Agalactie : absence de sécrétion lactée après la mise bas chez une femelle à terme. . Asthme : anomalie respiratoire brutale d'installation rapide et d'origine allergique due . Atélectasie : affaissement des alvéoles pulmonaires, consécutif à une obstruction . Circumanalomes : tumeurs des glandes du pourtour de l'anus.

Traitement des chancres Chez la femme...114 Chap. ... dans les narines par exemple, il donne lieu 'a des ulcères vénériens ordinaires, tandis ... 11 faut donc éviter que]a matikre gonorrhéique touche l'anus (1),]a bouche, . dans le rectum Par (les actes contre nature, y ajouter une)Incontinence très rebelle.

27 mars 2016 . 18 Rectum .. Coupe sagittale du petit bassin chez la femme. 4. 5. 6. 8. 7. 10 . 26 M. élévateur de l'anus. 27 Noyaux fibreux du périnée. 28 Anus . lément d'origine tuberculeuse ou mycosi- .. des maladies vénériennes. .. langage consécutif à une lésion cérébrale .. Rétrécissement de la fente palpé-.

. ANTIVOLS ANTONYME ANTONYMES ANTONYMIE ANTRE ANTRES ANUS .. CHEVROTER CHEVROTINE CHEWING-GUM CHEZ CHEZ-MOI CHEZ-SOI ... CONSCRIT CONSCRITS CONSECRATION CONSECUTIF CONSECUTIFS .. FEMME FEMMELETTE FEMMELETTES FEMMES FENAISSON FENAISSONS.

. ANIS ANON ANSE ANUS AOUT APAX APEX APRE APTE ARAK ARCS ARDU . CHEF CHER CHEZ CHIC CHOC CHOU CHUT CIEL CILS CIME CINQ CIRA CIRE .. FEINT FELEE FELER FELES FELEZ FELIN FELON FEMME FEMUR FENDE ... LESION LESONS LESTEE LESTER LESTES LESTEZ LETTRE LEURRA.

Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme.

Jean-Emile Lavigne Date de l'édition originale : 1874 Ce livre.

22 juil. 2014 . . "Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées" msgctxt ... non vénérienne" msgctxt "model:gnuhealth.pathology,name:A66" msgid .. msgid "Overlapping lesion of rectum, anus and anal canal" msgstr "Lésion à ... organs" msgstr "Tumeur maligne des organes génitaux de la femme,.

antécédents d'IST ou de salpingite, urétrite (cf. glossaire) chez le partenaire, notion de . En cas de suspicion d'infection à gonocoque : examiner : anus, bouche, amygdales. .. Inflammation résiduelle avec lésions de la muqueuse tubaire ou adhérences ... D'origine vénérienne, le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis est par.

The advantages of a permanent abdominal anus and of total closure of the sacral end of the rectum, in operations for cancer of the rectum : · The advantages .. Considérations pratiques sur le rétrécissement de l'urètre dit infranchissable et sur son ... Contribution à l'étude des lésions du rein chez les femmes en couches.

pression de repos du canal anal observée chez les patients souffrant d' ... est beaucoup plus difficile de retenir l'origine hémorroïdaire de rectorragies . de lésions de la marge (fissure, fistule, condylomes), avant de poser les .. sensibilité discriminative (gaz-matières), éviter les séquelles de rétrécissement et/ou.

21 mars 2007 . DIARRHEE D'ORIGINE PRESUMEE INFECTIEUSE ... SYPHILIS ET AUTRES MALADIES VENERIENNES . DE L'ANUS ET DU RECTUM. 0988 . AUTRES LESIONS CUTANEEES PRIMAIRES ... TUMEUR MALIGNE DU SEIN CHEZ LA FEMME .. HEPATITE CONSECUTIVE A DES MALADIES VIRALES.

8 mai 2013 . Santé des femmes et gynécologie : Guide de pratique clinique du personnel . Douleur pelvienne aiguë d'origine gynécologique; Atteinte inflammatoire pelvienne .. cicatrices; Anus : lésions, ulcérations, sensibilité, fissures, hémorroïdes . Comme le cancer du col utérin est plus répandu chez les femmes.

